

ПОВРЕДА МУШКОГ ПОЛНОГ ОРГАНА ИЗАЗВАНА УЈЕДОМ

Стефановић Г., Ивановић Д., Петронић Д.

Одељење за урологију, Здравствени центар Косовска Митровица

PENIS INJURY CAUSED BY A BITE

Стефановић Г., Ивановић Д., Петронић Д.

Department of Urology, Health centre Kosovska Mitrovica

SUMMARY

Considering the fact that there are freer and more varying sex activities, we have today more varying genital organs injuries both at men and women. We present you a patient with two penis injuries caused by a bite. It must be done a complete wound treatment with AT protection and maximum antibiotics appliance. It is necessary to perform an AIDS test.

Key words: Penis injuries caused by a bite, wound treatment, AT protection, AIDS test.

САЖЕТАК

Обзиром на све слободније и разноврсније упражњавање секса могуће су разноврсне повреде полних органа, било код жена или мушкараца. Приказујемо пацијента са две уједне ране на пенису. Обавезно се мора урадити комплетна обрада ране уз АТ заштиту и максималну примену антибиотика. Неопходно је урадити тест на AIDS.

Кључне речи: Уједне ране пениса, рана обрада, АТ заштита, тест на AIDS.

УВОД

Повреде пениса могу бити отворене и затворене. Пенис је релативно добро заштићен између бутина и покретање што објашњава ређе повређивање.

Класификације повреда према начину настајања:

- при раду са машинама;
- самоповређивање;
- повређивање;
- јатрогене повреде;
- радне повреде.

Повреде пениса према карактеру силе која на њега делује:

Тупа сила

- контузије
- констрикције
- руптура
- луксација

Оштра сила

- убодни
- уједи
- посекотине
- ампутација

У пракси се најчешће срећу повреде при раду са машинама или у саобраћају.



Слика 1. - Повреда мушког полног органа изазвана уједом.

Јатрогене повреде најчешће настају при циркумизицији, у ратним условима то је најчешће случај од нагазних мина.

Повреде коже пениса најчешће настају дејством оштре и тупе силе. Кожа пениса је повређена и код убодина, уједина и посекотина, али је типична повреда коже пениса денудација.

У остале повреде пениса спадају опекотине, убодине и уједине. Уједине настају најчешће од животиња или сексуалног партнера. Ми износимо случај пацијента М. Н. старог 27. год. незапосленог из Звечана.

У току упражњавања оралног секса партнерка стара такође 27. год. нанела му је две повреде - уједине - истоветног промера.

Једна повреда је била на дорзуму пениса а друга на десној латералној страни (промери истоветни, дужина ране 1 цм, ширина 0,4 и дубине 0,3 цм). Ивице рана су биле неравне и доста су крвариле.

По пријему урађена је тоалета ране, дебридемент и сатура обе ране. Примењена је и АТ заштита. Ординирани су цефалоспорици, аминогликозиди и Сhymoral forte дражеје због едема. Ране су свакодневно превијане уз испирање са Хидрогеном 3% и Повидон јодидом. После седам дана ране су зарасле пер примам.

Тест на АИДС младић је урадио у специјализованој лабораторији и исти је негативан, што нам за партнерку није познато.

Колико су се времена променила а и начин сексуалног упражњавања најбоље говори податак да су повреде ове врсте (иако ретке) детаљно наведене и описане у скорашњој књизи проф. Ј. Николића, док у старој књизи академика Петковића повреде од сексуалног партнера су само наведене.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hirurgija polnih organa - J. M. Nikolić, Beograd 2000. 1997.